



AVÍS N° 4 - 23/07/2020

TRACTAMENT MOSCA BLANCA

A la nostra zona, tenim presents quatre espècies de mosca blanca:

- Aleurothrixus floccosus,
- Dialeurodes citri,
- Paraleyrodes minei
- Parabemisia myricae.

Durant els darrers anys, s'ha produït un augment de parcel·les on s'han detectat poblacions de Dialeurodes citri i Paraleyrodes minei amb problemes per al seu control.

Mesures culturals: és recomanable realitzar podes per airejar les zones interiors dels arbres. Cal realitzar un adobat equilibrat per evitar un excés de vigor i eliminar els brots vegetatius excessius que actuen com a focus de la plaga.

Control biològic: els enemics naturals existents no controlen Dialeurodes citri ni Paraleyrodes minei.

Tractament fitosanitari: s'ha d'aplicar quan predominen les larves joves. Cal tenir en compte que les larves estan al revers de les fulles; per tant, cal mullar bé

- Es recomana **tractar durant els pròxims 20 dies**
Mandariners i Tarongers
- Volum de Caldo de **1700-2500lt/H**

Es recomana utilitzar **producte en efecte netejador** per facilitar l'eliminació de negreta.

**** ULL AMB EL NOMBRE D'APLICACIONS
MÀXIMES PER CAMPANYA ****





Tractament per a ous:

| Nom Comercial | Efecte | Matèria Activa | Dosi % | Aplicacions anuals |
|-------------------|---|--|----------|--------------------|
| AVENGER | Netejador de negreta Actua com a mullant | | 150cc | |
| NUTRACEUTICO | Netejador de negreta Actua com a mullant | | 150cc | 2 |
| BELPROIL-A | Actúa per asfíxia. Actua com a mullant | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V Nº Registre 13141 | 1l-1,25l | 2 |
| SANMITE/ POSEIDON | Producte Ovicida | PIRIBADEN 10% Nº Registre Es-00114 | 200cc | 1 |

Tractament per a larves:

| Nom Comercial | Efecte | Matèria Activa | Dosi % | Aplicacions anuals |
|---------------|---|--|----------|--------------------|
| AVENGER | Netejador de negreta Actua com a mullant | | 150cc | |
| NUTRACEUTICO | Netejador de negreta Actua com a mullant | | 150cc | 2 |
| BELPROIL-A | Actua per asfíxia. Actua com a mullant | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V Nº Registre 13141 | 1l-1,25l | 2 |
| EPIK/MOSPILAN | Producte Larvicida | ACETAMIPRID 20% [SP] P/P Nº Registre 23377 | 35-50g | 2 |





AVÍS Nº 4 23/07/2020

TRACTAMENT ARANYA ROJA

En cas que sigui necessari:

- Es recomana **tractar durant els pròxims 20 dies** Mandariners i Tarongers
- Volum de Caldo de **2500-3000lt/H**
- El **moment òptim 3 o 4 aranyes per fulla afectada.** Repetir sempre que supera les 4 aranyes vives per fulla afectada.
- El producte recomanat és:

| Nom Comercial | Matèria Activa | Dosi % | Aplicacions anuals |
|------------------|--|---------|--------------------|
| BORNEO | ETOXAZOL 11% [SC] P/V Nº Registre 23433 | 25cc | NP |
| DIABLO (Ovicida) | HEXITIAZOX 10% [WP] P/P Nº Registre 24299 | 10gr | NP |
| BELPROIL-A | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V Nº Registre 13141 | 1-1,25l | 2 |
| ENVIDOR | SPIRODICLOFEN 24% [SC] P/V Nº Registre 23972 | 20cc | NP |
| KANEMITE | ACEQUINOL 16,4% Nº Registre 25346 | 120cc | 1 |
| KOROMITE | MILBEMECTINA 0,93% [EC] P/VNº Registre 25931 | 150cc | 1 |
| BELPROIL-A | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V Nº Registre 13141 | 1-1,25l | 2 |
| BERMECTINE | ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V Nº Registre 21381 | 40cc | 3 |





AVÍS N° 4 23/07/2020

TRACTAMENT COTONET EN TARONGERS

Cotonet (*Planococcus citri*):

Mesures culturals: fer una poda que afavoreixi la ventilació de les zones interiors i evitar zones amb molta densitat vegetal. Es recomana controlar els nivells de formigues i impedir-ne la pujada als arbres.

Control biològic: es recomana utilitzar la lluita biològica per amollada de fauna útil a la primera generació. A causa de l'excel·lent treball que realitzen els seus depredadors naturals, es recomana vigilar les poblacions de *Cryptolaemus montrouzieri* i *Leptomastix dactylopii* i potenciar-ne la presència.

Tractament fitosanitari: si es respecten les poblacions dels enemics naturals, no hauria de ser necessari intervenir. S'aconsella tractar si se supera el 20% de fruits infestats.

Cotonet de Sudàfrica (*Delottococcus aberiae*):

S'ha detectat cotonet de les Valls en la nostra zona. Aquest cotonet **ocasiona deformacions importants** als fruits durant l'inici del seu desenvolupament que en comporten la depreciació comercial.

Si teniu **qualsevol sospita** de parcel·la afectada, cal que **contacteu amb els tècnics**.

Mesures culturals: cal evitar la difusió de l'insecte de les parcel·les atacades a altres camps. És aconsellable organitzar les tasques agrícoles de manera que finalitzin en les finques afectades per evitar passar l'insecte a zones on no és present.





Control biològic: el depredador *Cryptolaemus montrouzieri* actua sobre aquest cotonet. Tot i això, cal tenir en compte que el cotonet de les Valls inicia la seva activitat amb antelació a la del depredador.

Tractament fitosanitari: Es recomana mullar l'arbre abundantment, incloent-hi el tronc i la base de l'arbre. Es comprovarà l'efectivitat del tractament als 10 dies.

- Es recomana **tractar** Tarongers els pròxims 20 dies
- Aplicar un Volum de Caldo de **2500-3000lt/Ha**
- És important **mullar bé** per tal d'aconseguir efectivitats altes.

| Nom Comercial | Matèria Activa | Dosi % | Aplicacions anuals |
|---------------|---|---------|--------------------|
| CLOSER | SULFOXAFLOL 12% Nº Registre ES-00461 | 200cc | 1 |
| BELPROIL-A | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V Nº Registre 13141 | 1-1,25L | 2 |

